

微创穿刺治疗颅内出血

患者情况:

男，36岁。因“突发右侧肢体乏力伴意识模糊2小时余”入院。检查显示血压极高，达到214/138mmHg，意识模糊，右侧肢体瘫痪。颅脑CT显示左侧基底节脑出血（量约30ml），左侧脑组织受压移位。患者既往有高血压病史10余年，未曾规律服用降压药物。

治疗简述:

在CT定位下给患者实施了微创钻孔脑内血肿穿刺引流术，术中抽吸出部分暗红色陈旧血液。术后复查颅脑CT显示脑内血肿较术前明显减少，受压的脑组织恢复。

治疗评价:

脑出血传统的处理方法多采用开颅血肿清除术，其创伤大、失血多、手术技术复杂、并发症较多，一般需4-5小时才可完成。本次采用的微创钻孔脑内血肿穿刺引流术具有定位准确、操作简便、损伤小、血肿清除快捷等特点，一般可在1小时内完成，紧急情况下甚至可局麻下进行床边操作。该技术特别适用于合并多种疾病、难以耐受大手术的老年患者或危重患者。



术前 CT:左侧基底节脑内血肿，左侧脑组织受压，中线向右侧移位



术后 CT:左侧基底节脑内血肿大部分引出，左侧脑组织受压减轻，中线复位